



* Ved Her-2 positiv status og indikasjon for FEC: Trastuzumab (Herceptin) infusjon hver 3. uke i 1 år etter avsluttet kjemoterapi/strålebehandling. Ved indikasjon for taxan, se eget opplegg under punkt ³

¹Hormonreseptor: ER-/PgR-=begge <10%, ER+ og/eller PgR+= en el begge ≥10-100%, ER/ PgR svakt pos= en el begge ≥10% men < 50%, ER og/eller PgR sterkt pos=en el begge ≥50%

²FEC gies hver 3. uke, FEC₆₀: Epirubicin doseres til 60 mg/m², FEC₁₀₀: Epirubicin doseres til 100 mg/m²

³T: Docetaxel 100 mg/m² hver tredje uke x 4 eller paclitaxel 80mg/m² hver uke x 12. Ved Her2-positiv status gies Herceptin parallelt med taxan og strålebehandlingen.

⁴Tam=Tamoxifen 20 mg x 1, AI=Aromatase inhibitor/inaktivator (anastrozole 1 mg x 1, exemestane 25 mg x 1, letrozole 2.5 mg x 1). Der hvor Tam er gitt i >2-<5 år, bytt til AI i 3 år. Ved AI m å det gjøres benteitthetsmålinger ved oppstart, etter 1 år og deretter annethvert år inntil avslutning. Benytt VitD+Calsium profylaktisk.