


NBCGs retningslinjer for ADJUVANT BEHANDLING VED BRYSTKREFT



¹Hormonreseptor: ER-/PgR= Begge <10%, ER+ og/eller PgR+= en eller begge ≥10-100%, ER/ PgR svakt pos= en eller begge ≥10% men <50%, ER og/eller PgR sterkt pos=en eller begge ≥50%

²FEC gies hver 3. uke. FEC₆₀: Epirubicin doseres til 60 mg/m². FEC₁₀₀: Epirubicin doseres til 100 mg/m²

³T: Docetaxel 100 mg/m² hver tredje uke x 4 eller paclitaxel 80mg/m² hver uke x 12. Ved HER2-positiv status gies herceptin parallelt med taxan og strålebehandling.

⁴Mellom 50-55 år avgjør menopausal status om endokrin behandlingsopplegg for < 55 eller ≥55 år kan benyttes. Se NBCGs anbefalinger for adjuvant systemisk behandling.

⁵Tam=Tamoxifen 20 mg x 1, AI=Aromatase inhibitor/inaktivator (anastrozole 1 mg x 1, exemestane 25 mg x 1, letrozole 2.5 mg x 1). Der hvor Tam er gitt i >2-<5 år, bytt til AI i 3 år. Ved AI må det gjøres bentetthetsmålinger ved oppstart, etter 1 år og deretter hvert 2. år inntil avslutning. Benytt VitD+Calsium profylaktisk.